

レジメン名	FOLFIRI + C-mab
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	RAS野生型

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1
2	生食 デキサート注	100mL 6.6mg	点滴静注	30分	
3	生食 アービタックス (C-mab)注	500mL 500mg/m ²		2時間	
4	生食	100mL		30分	
5	パロノセトロン注 アロカリス注	0.75mg 50mL 235mg		30分	
6-a	ブドウ糖 イリノテカン(CPT-11)注	500mL 150mg/m ²		90分 (bと同時)	
6-b	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m ²		2時間 (aと同時)	
7	ブドウ糖 5-FU注	50mL 400mg/m ²		5分	day 1-3
8	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m ²	点滴静注 (持続)	46時間	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)発現時は抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St. ジョーンズワートと薬物相互作用あり。
- C-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。