

レジメン名	FP
対象疾患名	食道がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット注 フロセミド注	500mL 20mg		15分	
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
4	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 80mg/m <sup>2</sup>		1時間	
5	生食 デキサート注	50mL 6.6mg		15分	day 2-5
6	生食 5-FU注	500mL 800mg/m <sup>2</sup>		24時間	day 1-5 ( 持続 )
7	生食	500mL		1時間	day 1
8	ソルアセトF	500mL		1時間	day 1-3
9	アクチット	500mL		1時間	

**【主な副作用】**

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

**【その他注意事項】**

- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。
- 5-FU: ワーフアリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)