

| レジメン名 | オプジーボ |
|---------|------------|
| 対象疾患名 | 食道がん |
| 1クールの日数 | 14日 or 28日 |
| 催吐性リスク | 最小度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|--------------|-------------------------|------|------|-------|
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | day 1 |
| 2 | 生食 オプジーボ注 | 100mL 240mg or 480mg | | 30分 | |
| 3 | 生食 | 50mL | | 5分 | |

※2週間に1回の場合は240mg、4週間に1回の場合は480mgで投与

【主な副作用】

間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- ・免疫療法施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。
- ・ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1～3ヶ月ごとに施行する。

- 間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- 甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- 下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- 1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- 大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- 肝障害: エコー 造影CT