

レジメン名	CDDP + VNR
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
4	生食 デキサート注	50mL 3.3mg		15分	day 8
5	生食 ロゼウス(VNR)注	50mL 25mg/m ²		5分	day 1, 8
6	生食	100mL		5分	
7	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 80mg/m ²		1時間	day 1
8	生食	500mL		1時間	
9	ソルアセトF	500mL		1時間	day1, (2, 3)
10	アクチット	500mL		1時間	
11	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、腎障害、肝障害、浮腫、静脈炎、電解質異常、神経障害（末梢神経障害、聴力障害）

【その他注意事項】

●CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1推奨)。