

レジメン名	CBDCA + PTX + テセントリク
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1
2	生食	50mL	点滴静注	15分	day 1
3	生食 テセントリク注	100mL 1200mg		初回60分 2回目以降30分	
4	生食	50mL		5分	
5	ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 20mg		15分	
6	パロノセトロン注 アロカリス注	0.75mg 50mL 235mg		30分	
7	ブドウ糖 パクリタキセル(PTX)注	500mL 200mg/m ²		3時間	
8	ブドウ糖 カルボプラチン(CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	
9	ブドウ糖	50mL		5分	

【化学療法による主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹

【免疫療法による主な副作用】

間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- テセントリク: 施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1~3ヶ月ごとに施行する。
- 間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- 甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- 下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- 1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- 大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- 肝障害: エコー 造影CT