

レジメン名	BEP
対象疾患名	精巣腫瘍
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1-5
2※	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg (6.6mg)		30分	day 1-5, 8, 15
3	生食 ブレオ(BLM)注	100mL 30mg		30分	day 1, 8, 15
4	生食	50mL		5分	day 1-5, 8, 15
5	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 20mg/m ²		1時間	day 1-5
6	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
7	生食 エトポシド(VP-16)注	500mL 100mg/m ²		2時間	
8	生食	500mL		1時間	

※day 2-5, 8, 15の前投薬はデキサート6.6mgのみ

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、骨髄抑制、肝障害、肺障害、発熱、発疹、血管痛

【その他注意事項】

- BLM: 総投与量は360mg以下とする。
- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。