

| | |
|---------|---------------|
| レジメン名 | dose dense TC |
| 対象疾患名 | 卵巣がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 中等度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|
| 1 | ジフェンヒドラミン錠 | 50mg | 内服 | 投与前 | day 1, 8, 15 |
| 2 | ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注 | 50mL 6.6mg 20mg | 点滴静注 | 15分 | day 1, 8, 15 |
| 3 | パロノセトロン注 アロカリス注 | 0.75mg 50mL 235mg | | 30分 | day 1 |
| 4 | ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注 | 500mL 80mg/m ² | | 1時間 | day 1, 8, 15 |
| 5 | ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注 | 250mL AUC = 6 | | 1時間 | day 1 |
| 6 | ブドウ糖 | 50mL | | 5分 | |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹

【その他注意事項】

●PTX:アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。