

レジメン名	TP
対象疾患名	子宮頸がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 ファモチジン注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg 20mg	点滴静注	30分	day 1
2	ブドウ糖	50mL		30分	
3	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	500mL 175mg/m ²		3時間	
4	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq		1時間	
5	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
6	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 50mg/m ²		1時間	
7	生食	500mL		1時間	
8	アクチット	500mL		1時間	
9	ジフェンヒドラミン錠	5錠		内服	
10	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	(3日分)		

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢・、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、関節痛・筋肉痛、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、過敏症

【その他注意事項】

- PTX:アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。