

| | |
|---------|----------|
| レジメン名 | IRIS(4w) |
| 対象疾患名 | 大腸がん |
| 1クールの日数 | 28日 |
| 催吐性リスク | 中等度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|------------------------------|-------------------------------|------|--------|----------------|
| 1 | パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 | 0.75mg 50mL 235mg 3.3mg | 点滴静注 | 30分 | day 1, 15 |
| 2 | ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注 | 500mL 125mg/m ² | | 90分 | |
| 3 | ブドウ糖 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | エスワンタイホウ (S-1) | ※80mg/m ² | 内服 | (14日分) | day 1(夕)-15(朝) |

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害

【その他注意事項】

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)発現時は抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。