

| レジメン名   | IRIS + P-mab |
|---------|--------------|
| 対象疾患名   | 大腸がん         |
| 1クールの日数 | 28日          |
| 催吐性リスク  | 中等度          |
| その他注意事項 | RAS野生型       |

| No | 薬剤名                          | 標準投与量                         | 投与方法 | 投与時間   | 投与日            |
|----|------------------------------|-------------------------------|------|--------|----------------|
| 1  | 生食                           | 50mL                          | 点滴静注 | 5分     | day 1, 15      |
| 2  | 生食<br>ベクティビックス<br>(P-mab)注   | 100mL<br>6mg/kg               |      | 60分    |                |
| 3  | 生食                           | 50mL                          |      | 5分     |                |
| 4  | パロノセトロン注<br>アロカリス注<br>デキサート注 | 0.75mg 50mL<br>235mg<br>3.3mg |      | 30分    |                |
| 5  | ブドウ糖<br>イリノテカン<br>(CPT-11)注  | 500mL<br>100mg/m <sup>2</sup> |      | 90分    |                |
| 6  | ブドウ糖                         | 50mL                          |      | 5分     |                |
| 7  | エスワンタイホウ<br>(S-1)            | ※80mg/m <sup>2</sup>          | 内服   | (14日分) | day 1(夕)-15(朝) |

**【S-1投与量(処方目安)】**

体表面積(m<sup>2</sup>) 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日  
1.5以上 20mg 6錠/日

**【主な副作用】**

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

**【その他注意事項】**

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)発現時は抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。
- P-mab: 皮膚症状対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。