

レジメン名	CPT-11 + P-mab
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	RAS野生型

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 ベクティビックス (P-mab)注	100mL 6mg/kg		60分	
3	生食	50mL		5分	
4	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg		30分	
5	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 150mg/m <sup>2</sup>		90分	
6	ブドウ糖	50mL		5分	

### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、肝障害、皮膚障害（皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症）、低Mg血症、Infusion reaction

### 【その他注意事項】

- CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。
- P-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。