

レジメン名	FOLFOXIRI
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg	点滴静注	30分	day 1
2	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 165mg/m <sup>2</sup>		90分	
3-a	ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注	500mL 85mg/m <sup>2</sup>		2時間 (bと同時)	
3-b	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m <sup>2</sup>		2時間 (aと同時)	
4	ブドウ糖 5-FU注	50mL 400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (急速)	5分	
5	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (持続)	46時間	day 1-3
8	デカドロン錠	4mg 2T/分2			day 2-4

【主な副作用】 悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。