

レジメン名	SP(5w)
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	35日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 8
2	アクチット注 フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
4	生食 シスプラチン (CDDP)注	500mL 60mg/m <sup>2</sup>		1時間	
5	生食	500mL		1時間	day 8, (9, 10)
6	ソルアセトF	500mL		1時間	
7	アクチット	500mL		1時間	
8	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m <sup>2</sup>	内服	(21日分)	day1(夕)-22(朝)
9	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼		(3日分)	day 9-11

#### 【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m<sup>2</sup>) : 1.25未満 20mg 4錠/日    1.25~1.5未満 25mg 4錠/日  
1.5以上 20mg 6錠/日

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、腎障害、肝障害、流涙、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

#### 【その他注意事項】

- CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1推奨)。
- S-1:ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。