

レジメン名	CAPOX + T-mab
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	HER2陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 ハーセプチン (T-mab)注	250mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg		初回90分 2回目～30分	
3	生食	50mL		5分	
4	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg		15分	
5	ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注	500mL 130mg/m <sup>2</sup>		2時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	カペシタビン (Cape)	※2000mg/m <sup>2</sup>	内服	(14日分)	day 1(夕)-15(朝)

#### 【Cape投与量(処方目安)】

体表面積(m <sup>2</sup> )	1.36未満	8錠/日	1.36～1.66未満	10錠/日
	1.66～1.96未満	12錠/日	1.96以上	14錠/日

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、手足症候群、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)

#### 【その他注意事項】

- Cape: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。手足症候群対策として保湿剤、ステロイド外用剤を使用する。
- L-OHP: アレルギーは7～8回目で起こりやすい。