

レジメン名	CPT-11 + CDDP
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ソルアセトF	500mL	点滴静注	1時間	day 1, 15
2	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
3	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 60mg/m ²		90分	
4	生食 シスプラチン (CDDP)注	500mL 30mg/m ²		1時間	
5	アクチット	500mL		1時間	
8	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4, 16-18

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

【その他注意事項】

●CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。

●CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。