

|         |               |
|---------|---------------|
| レジメン名   | nab-PTX + GEM |
| 対象疾患名   | 膵がん           |
| 1クールの日数 | 28日           |
| 催吐性リスク  | 中等度           |
| その他注意事項 |               |

| No | 薬剤名                        | 標準投与量                          | 投与方法 | 投与時間 | 投与日          |
|----|----------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|
| 1  | グラニセトロン注<br>デキサート注         | 1mg 50mL<br>9.9mg              | 点滴静注 | 15分  | day 1, 8, 15 |
| 2  | 生食<br>アブラキサン<br>(nab-PTX)注 | 50mL<br>125mg/m <sup>2</sup>   |      | 30分  |              |
| 3  | 生食                         | 50mL                           |      | 5分   |              |
| 4  | ブドウ糖<br>ゲムシタビン<br>(GEM)注   | 100mL<br>1000mg/m <sup>2</sup> |      | 30分  |              |
| 5  | ブドウ糖                       | 50mL                           |      | 5分   |              |

### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、発熱、発疹、血管痛、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、皮膚障害

### 【その他注意事項】

- nab-PTX: CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- GEM: 点滴時間延長で副作用が増強。