

レジメン名	nal-IRI + 5-FU/LV
対象疾患名	膵がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg	点滴静注	30分	day 1
2	ブドウ糖 オニバイド(nal-IRI)注	500mL 70mg/m <sup>2</sup>		90分	
3	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m <sup>2</sup>		2時間	
4	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (持続)	46時間	day 1-3

**【主な副作用】**

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害

**【その他注意事項】**

●5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。

●nal-IRI: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。