

レジメン名	FEC
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	※FN高リスク

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg	点滴静注	30分	day 1
2	生食 エピルビシン(EPI)注	50mL 100mg/m ²		10分	
3	生食	50mL		5分	
4	生食 エンドキサン(CPA)注	250mL 500mg/m ²		30分	
5	生食 5-FU注	50mL 500mg/m ²		5分	
6	生食	50mL		5分	
7	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、倦怠感、口内炎、脱毛、出血性膀胱炎、骨髄抑制、肝障害、腎障害、心障害

【その他注意事項】

※発熱性好中球減少(FN)対策としてジースタの使用考慮。

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)
- EPI: 総投与量900mg/m²を超えると心毒性のリスク増大。投与前に心機能を確認する。
- CPA: 出血性膀胱炎対策として水分摂取を心がける。