

レジメン名	CDDP + VP-16
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
4	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 60mg/m ²		1時間	
5	生食	50mL		5分	
6	生食 デキサート注	50mL 6.6mg		15分	day 2, 3
7	生食 エトポシド(VP-16)注	500mL 100mg/m ²		1時間	day 1-3
8	生食	50mL		5分	day 2, 3
9	ヴィーンF	500mL		1時間	day 1
10	アクチット	500mL		1時間	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、発熱、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

【その他注意事項】

●CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。