

レジメン名	CBDCA + CPT-11
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg (9.9mg)	点滴静注	30分	day 1, 8, 15
2	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	day 1
3	ブドウ糖	50mL		5分	
4	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 50mg/m ²		90分	day 1, 8, 15
5	ブドウ糖	50mL		5分	

※アロカリスはday 1のみ。Day 8, 15のデキサートは9.9mg

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹

【その他注意事項】

●CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。