

レジメン名	FOLFIRI + RAM
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1
2	生食 デキサート柱	50mL 6.6mg	点滴静注	15分	
3	生食 サイラムザ(RAM)注	250mL 8mg/kg		初回60分 2回目～ 30分	
4	生食	50mL		5分	
5	パロノセトロン注 アロカリス注	0.75mg 50mL 235mg		30分	
6-a	ブドウ糖 イリノテカン(CPT-11)注	500mL 150mg/m ²		90分 (bと同時)	
6-b	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m ²		2時間 (aと同時)	
7	ブドウ糖 5-FU注	50mL 400mg/m ²		5分	
8	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m ²	点滴静注 (持続)	46時間	day 1-3

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、肝障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)発現時は抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。