

レジメン名	CBDCA + VP-16 + Dur
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 イミフィンジ (Dur)注	100mL 1500mg		60分	
3	生食	50mL		5分	
4※	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg		30分	day 1-3
5	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 5		1時間	day 1
6	生食	50mL		5分	day 1-3
7	生食 エトポシド (VP-16)注	500mL 100mg/m ²		1時間	
8	生食	50mL		5分	

※day 2, 3の前投薬はデキサートのみ

【化学療法による主な副作用】 悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、発熱、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹

【免疫療法による主な副作用】 間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

●Dur: 施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1~3ヶ月ごとに施行する。

- ・間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- ・甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- ・下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- ・1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- ・大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- ・肝障害: エコー 造影CT