

レジメン名	CDDP + PEM
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
4	生食 ペムトレキセド(PEM)注	100mL 500mg/m <sup>2</sup>		10分	
5	生食	50mL		5分	
6	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 75mg/m <sup>2</sup>		1時間	
7	生食	500mL		1時間	
8	ヴィーンF	500mL		1時間	day 1, (2, 3)
9	アクチット	500mL		1時間	
10	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼		内服	(3日分)

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、倦怠感、口内炎、発疹、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害（末梢神経障害、聴力障害）

#### 【その他注意事項】

●CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。

●PEM: 治療開始7日前より葉酸0.5mgを1日1回連日経口投与、ビタミンB12を1回1mg筋注する(9週間に1回)。NSAIDsや腎毒性を有する薬剤または腎排泄型薬剤(プロベネシド、ペニシリン等)と薬物相互作用あり(作用増強)。