

レジメン名	CBDCA + PEM + Osimertinib
対象疾患名	非小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	EGFR変異陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg	点滴静注	30分	day 1
2	生食 ペムトレキセド (PEM)注	100mL 500mg/m ²		10分	
3	生食	50mL		5分	
4	ブドウ糖 カルボプラチン CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	
5	ブドウ糖	50mL		5分	
6	タグリッソ錠	40-80mg 1T/朝	内服	連日	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、倦怠感、口内炎、骨髄抑制、肝障害、腎障害、末梢神経障害、血管痛、皮膚障害、間質性肺炎、QT延長

【その他注意事項】

●PEM: 治療開始7日前より葉酸0.5mgを1日1回連日経口投与、ビタミンB12を1回1mg筋注する(9週間に1回)。NSAIDsや腎毒性を有する薬剤または腎排泄型薬剤と薬物相互作用あり(作用増強の可能性あり)。

●Osimertinib

- ・CYP3A4誘導薬と薬物相互作用あり(作用減弱の可能性あり)。
- ・P-gpあるいはBCRPの基質となる薬剤と相互作用あり(併用薬の作用増強の可能性あり)。
- ・QT延長を起こす薬剤との併用により、QT延長増強の可能性あり。