

|         |          |
|---------|----------|
| レジメン名   | PEM + BV |
| 対象疾患名   | 非小細胞肺癌   |
| 1クールの日数 | 21日      |
| 催吐性リスク  | 軽度       |
| その他注意事項 |          |

| No | 薬剤名                     | 標準投与量                         | 投与方法 | 投与時間             | 投与日   |
|----|-------------------------|-------------------------------|------|------------------|-------|
| 1  | グラニセトロン注<br>デキサート注      | 1mg 50mL<br>6.6mg             | 点滴静注 | 15分              | day 1 |
| 2  | 生食<br>ペメトレキセド<br>(PEM)注 | 100mL<br>500mg/m <sup>2</sup> |      | 10分              |       |
| 3  | 生食                      | 50mL                          |      | 5分               |       |
| 4  | 生食<br>ベバシズマブ(BV)注       | 100mL<br>15mg/kg              |      | 初回90分<br>60分→30分 |       |
| 5  | 生食                      | 50mL                          |      | 5分               |       |

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、肝障害、発疹、神経障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

#### 【その他注意事項】

●PEM: 治療開始7日前より葉酸0.5mgを1日1回連日経口投与、ビタミンB12を1回1mg筋注する(9週間に1回)。NSAIDsや腎毒性を有する薬剤または腎排泄型薬剤(プロベネシド、ペニシリン等)と薬物相互作用あり(作用増強の可能性あり)。