

レジメン名	PEM + Osimertinib
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	EGFR変異陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 デキサート注	50mL 6.6mg	点滴静注	15分	day 1
2	生食 ペムレキセド (PEM)注	100mL 500mg/m ²		10分	
3	生食	50mL		5分	
4	タグリッソ錠	40-80mg 1T/朝	内服	連日	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、肝障害、発疹、神経障害

【その他注意事項】

●PEM

- ・治療開始7日前より葉酸0.5mgを1日1回連日経口投与、ビタミンB12を1回1mg筋注する(9週間に1回)。
- ・NSAIDsや腎毒性を有する薬剤または腎排泄型薬剤(プロベネシド、ペニシリン等)と薬物相互作用あり(作用増強の可能性あり)。

●Osimertinib

- ・CYP3A4誘導薬と薬物相互作用あり(作用減弱の可能性あり)。
- ・P-gpあるいはBCRPの基質となる薬剤と相互作用あり(併用薬の作用増強の可能性あり)。
- ・QT延長を起こす薬剤との併用により、QT延長増強の可能性あり。