

|         |            |
|---------|------------|
| レジメン名   | Atezo + BV |
| 対象疾患名   | 非小細胞肺癌     |
| 1クールの日数 | 21日        |
| 催吐性リスク  | 最小度        |
| その他注意事項 |            |

| No | 薬剤名                      | 標準投与量            | 投与方法 | 投与時間              | 投与日   |
|----|--------------------------|------------------|------|-------------------|-------|
| 1  | 生食                       | 50mL             | 点滴静注 | 5分                | day 1 |
| 2  | 生食<br>テセントリク<br>(Atezo)注 | 250mL<br>1200mg  |      | 初回60分<br>2回目～ 30分 |       |
| 3  | 生食                       | 50mL             |      | 5分                |       |
| 4  | 生食<br>ベバシズマブ<br>(BV)注    | 100mL<br>15mg/kg |      | 初回90分<br>60分→30分  |       |
| 5  | 生食                       | 50mL             |      | 5分                |       |

【BVによる主な副作用】 高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【免疫療法による主な副作用】 間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

●Atezo: 施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1～3ヶ月ごとに施行する。

- ・間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- ・甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- ・下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- ・1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- ・大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- ・肝障害: エコー 造影CT