

レジメン名	Nivo + Ipi
対象疾患名	非小細胞肺がん
1クールの日数	Nivo: 21日 Ipi: 42日
催吐性リスク	最小度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 オプジーボ (Nivo)注	100mL 360mg		30分	
3	生食	50mL		5分	
4	生食 ヤーボイ(Ipi)注	50mL 1mg/kg		30分	
5	生食	50mL		5分	

【主な副作用】

間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- 免疫療法施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。
- ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1～3ヶ月ごとに施行する。
 - ・間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
 - ・甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
 - ・下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
 - ・1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
 - ・大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
 - ・肝障害: エコー 造影CT