

レジメン名	GC
対象疾患名	尿路上皮がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ブドウ糖 デキサート注	50mL 3.3mg	点滴静注	15分	day1, 15, 22
2	ブドウ糖 ゲムシタビン(GEM)注	100mL 1000mg/m ²		30分	
3	ブドウ糖	50mL		5分	
4	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq		1時間	day 2
5	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
6	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	075mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
7	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 70mg/m ²		1時間	
8	生食	500mL		1時間	
9	ヴィーンF	500mL		1時間	day 2, (3, 4)
10	アクチット	500mL		1時間	
13	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 3-5

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、骨髄抑制、肝障害、発熱、発疹、血管痛

【その他注意事項】

●CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。