

レジメン名	Pembro + EV
対象疾患名	尿路上皮がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 デキサート注	50mL 6.6mg	点滴静注	15分	day 1,8
2	生食 パドセブ(EV)注	50mL 1.25mg/kg		30分	
3	生食	50mL		5分	
4	生食 キイトルーダ (Pembro)注	100mL 200mg		30分	day 1
5	生食	50mL		5分	

【EVによる主な副作用】 悪心、食欲不振、便秘、下痢、倦怠感、末梢神経障害、脱毛、皮膚障害、角膜障害、味覚不全、骨髄抑制、高血糖、間質性肺炎

【免疫療法による主な副作用】 間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- EV: CYP3A4阻害薬と薬物相互作用あり(EVの作用増強の可能性)。
- Pembro: 免疫療法施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1~3ヶ月ごとに施行する。
 - ・間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
 - ・甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
 - ・下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
 - ・1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
 - ・大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
 - ・肝障害: エコー 造影CT