

| | |
|---------|-----------|
| レジメン名 | DTX + DAR |
| 対象疾患名 | 前立腺がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 軽度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|--------------------------|------------------------------|------|------|-------|
| 1 | ブドウ糖 デキサート注 | 50mL 6.6mg | 点滴静注 | 15分 | day 1 |
| 2 | ブドウ糖 ドセタキセル (DTX)注 | 250mL 75mg/m ² | | 1時間 | |
| 3 | ブドウ糖 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | ニューベクオ (DAR)錠 | 300mg 4T/分2 | 内服 | — | 連日 |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、便秘、下痢、発熱、倦怠感、口内炎、脱毛、高血圧、骨髄抑制、肝障害、関節痛、末梢神経障害、浮腫、爪障害、ほてり

【その他注意事項】

●DTX

- ・FN対策として、ペグフィルグラスチムの使用を考慮。
- ・アゾール系抗真菌薬、EM、CAMは相互作用あり(作用増強)。

●DAR

- ・CYP3A誘導薬との相互作用あり(作用減弱)
- ・BCRP、OATP1B1およびOATP1B3の基質(ロスバスタチン等)と相互作用あり(併用薬の作用増強)。