

レジメン名	Pembro + Axi
対象疾患名	腎細胞がん
1クールの日数	21日 or 42日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 キイトルーダ (Pembro)注	100mL 200mg or 400mg		30分	
3	生食	50mL		5分	
4	インライタ (Axi)	5mg/回	内服	1日2回	連日

※3週間に1回の場合は200mg、6週間に1回の場合は400mgで投与

**【Axiによる主な副作用】**

高血圧、発声障害、悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、発疹、倦怠感、甲状腺機能障害

**【免疫療法による主な副作用】**

間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

**【その他注意事項】**

- Axi: CYP3A4/5誘導剤、阻害剤と薬物相互作用あり。
- Pembro: 免疫療法施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。  
ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1~3ヶ月ごとに施行する。
- ・間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- ・甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- ・下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- ・1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- ・大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- ・肝障害: エコー 造影CT