

| | |
|---------|----------------|
| レジメン名 | CPT-11 + P-mab |
| 対象疾患名 | 大腸がん |
| 1クールの日数 | 14日 |
| 催吐性リスク | 中等度 |
| その他注意事項 | RAS野生型 |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|------------------------------|-------------------------------|------|------|-------|
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | day 1 |
| 2 | 生食 ベクティビックス (P-mab)注 | 100mL 6mg/kg | | 60分 | |
| 3 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 | 0.75mg 50mL 235mg 3.3mg | | 30分 | |
| 5 | ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注 | 500mL 150mg/m ² | | 90分 | |
| 6 | ブドウ糖 | 50mL | | 5分 | |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、肝障害、皮膚障害（皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症）、低Mg血症、Infusion reaction

【その他注意事項】

●CPT-11: コリン様症状（発汗等）に注意。抗コリン薬（ブスコパン等）の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。

●P-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。