

| | |
|---------|-----------------|
| レジメン名 | sLV5FU2 + P-mab |
| 対象疾患名 | 大腸がん |
| 1クールの日数 | 14日 |
| 催吐性リスク | 軽度 |
| その他注意事項 | RAS野生型 |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|----------------------------|-------------------------------|--------------|------|---------|
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | day 1 |
| 2 | 生食 ベクティビックス (P-mab)注 | 100mL 6mg/kg | | 1時間 | |
| 3 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | ブドウ糖 デキサート注 | 50mL 6.6mg | | 15分 | |
| 5 | ブドウ糖 レボホリナート注 | 250mL 200mg/m ² | | 2時間 | |
| 6 | ブドウ糖 5-FU注 | 50mL 400mg/m ² | | 5分 | |
| 7 | 生食 5-FU注 | 適宜 2400mg/m ² | 点滴静注 (持続) | 46時間 | day 1-3 |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- P-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。