

レジメン名	FTD/TPI + BV
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1, 15
2	生食 ベバシズマブ (BV)注	100mL 7.5mg/kg		初回90分 60分→30分	
3	生食	50mL		5分	
4	ロンサーフ (FTD/TPI)	※70mg/m ² /日	内服	(10日分)	day1(夕)-6(朝) day8(夕)-13(朝) 又は day2(朝)-6(夕) day9(朝)-13(夕)

【FTD/TPI投与量(処方目安)】

体表面積1.07未満: 15mg 2錠・20mg 2錠/日	1.69~1.84未満: 20mg 6錠/日
(m ²) 1.07~1.23未満: 20mg 4錠/日	1.84~1.99未満: 15mg 6錠・20mg 2錠/日
1.23~1.38未満: 15mg 6錠/日	1.99~2.15未満: 15mg 4錠・20mg 4錠/日
1.38~1.53未満: 15mg 4錠・20mg 2錠/日	2.15以上: 15mg 2錠・20mg 6錠/日
1.53~1.69未満: 15mg 2錠・20mg 4錠/日	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、骨髄抑制、肝障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

●FTD/TPI: MTX、フルシトシンと薬物相互作用あり(骨髄抑制等の副作用増強)。