

| | |
|---------|-------|
| レジメン名 | CAPOX |
| 対象疾患名 | 胃がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 中等度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|------------------------------|-------------------------------|------|--------|----------------|
| 1 | グラニセトロン注 デキサート注 | 1mg 50mL 9.9mg | 点滴静注 | 15分 | day 1 |
| 2 | ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注 | 500mL 130mg/m ² | | 2時間 | |
| 3 | ブドウ糖 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | カペシタビン (Cape) | ※2000mg/m ² | 内服 | (14日分) | day 1(夕)-15(朝) |

【Cape投与量(処方目安)】

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| 体表面積(m ²) | 1.36未満 | 8錠/日 | 1.36~1.66未満 | 10錠/日 |
| | 1.66~1.96未満 | 12錠/日 | 1.96以上 | 14錠/日 |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、手足症候群、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)

【その他注意事項】

●Cape: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。手足症候群対策として保湿剤、ステロイド外用剤を使用する。

●L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。