

レジメン名	weekly PTX + RAM
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1, 8, 15
2	生食 (ブドウ糖) デキサート注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 20mg	点滴静注	15分	(ブドウ糖day 8) day 1, 15
3	生食 サイラムザ (RAM)注	250mL 8mg/kg		初回1時間 2回目～30分	day 1, 15
4	生食	50mL		5分	
5	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	250mL 80mg/m <sup>2</sup>		1時間	day 1, 8, 15
6	ブドウ糖	50mL		5分	

### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、爪障害、過敏症、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

### 【その他注意事項】

●PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。