

レジメン名	S-1 + DTX
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	術後補助(6クール)

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ブドウ糖 デキサート注	50mL 6.6mg	点滴静注	15分	day 1
2	ブドウ糖 ドセタキセル (DTX)注	250mL 40mg/m ²		1時間	
3	ブドウ糖	50mL		5分	
4	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m ²	内服	(14日分)	day1(夕)-15 (朝)
5	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) : 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、浮腫、爪障害

【その他注意事項】

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。