

レジメン名	mFOLFOX6 + Zolbetuximab
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	CLDN18.2陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 ポララミン注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg 5mg	点滴静注	30分	day 1
2	生食 ビロイ (Zolbetuximab)注	250~500mL 初回800mg/m ² 2回目~ 400mg/m ²		2時間以上	
3	生食	50mL		5分	
4-a	ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注	500mL 85mg/m ²		2時間 (bと同時)	
4-b	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m ²		2時間 (aと同時)	
6	ブドウ糖 5-FU注	50mL 400mg/m ²		5分	
7	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m ²	点滴静注 (持続)	46時間	day 1-3

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、Infusion reaction

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。
- Zolbetuximab: 投与中の悪心、嘔吐を含むinfusion reactionに注意。