

レジメン名	SOX + Zolbetuximab
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	CLDN18.2陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 ポララミン注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg 5mg	点滴静注	30分	day 1
2	生食 ビロイ (Zolbetuximab)注	250~500mL 初回800mg/m ² 2回目~ 600mg/m ²		2時間以上	
3	生食	50mL		5分	
5	ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注	500mL 130mg/m ²		2時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m ²		内服	

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) : 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)、心障害、infusion reaction

【その他注意事項】

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。
- Zolbetuximab: 投与中の悪心、嘔吐を含むinfusion reactionに注意。