

レジメン名	CAPOX + Zolbetuximab
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	CLDN18.2陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 ポララミン注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg 5mg	点滴静注	30分	day 1
2	生食 ビロイ (Zolbetuximab)注	250~500mL 初回800mg/m ² 2回目~ 600mg/m ²		2時間以上	
3	生食	50mL		5分	
5	ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注	500mL 130mg/m ²		2時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	カペシタビン (Cape)	※2000mg/m ²	内服	(14日分)	day 1(夕)-15(朝)

【Cape投与量(処方目安)】

体表面積(m²) 1.36未満 8錠/日 1.36~1.66未満 10錠/日
1.66~1.96未満 12錠/日 1.96以上 14錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、手足症候群、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)、infusion reaction

【その他注意事項】

●Cape: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。手足症候群対策として保湿剤、ステロイド外用剤を使用する。

●L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。

●Zolbetuximab: 投与中の悪心、嘔吐を含むinfusion reactionに注意。