

| | |
|---------|------------|
| レジメン名 | FOLFIRINOX |
| 対象疾患名 | 膵がん |
| 1クールの日数 | 14日 |
| 催吐性リスク | 高度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|---------|
| 1 | パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 | 0.75mg 50mL 235mg 9.9mg | 点滴静注 | 30分 | day 1 |
| 2 | ブドウ糖 オキサリプラチン (L-OHP)注 | 500mL 85mg/m ² | | 2時間 | |
| 3-a | ブドウ糖 レボホリナート注 | 250mL 200mg/m ² | | 2時間 (bと同時) | |
| 3-b | ブドウ糖 イリノテカン(CPT-11)注 | 500mL 180mg/m ² | | 90分 (a投与30分後) | |
| 4 | ブドウ糖 5-FU注 | 50mL 400mg/m ² | | 5分 | |
| 5 | 生食 5-FU注 | 適宜 2400mg/m ² | 点滴静注 (持続) | 46時間 | day 1-3 |
| 6 | デカドロン錠 | 4mg 2T/分2 | 内服 | (3日分) | day 2-4 |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。