

|         |                  |
|---------|------------------|
| レジメン名   | mFOLFOX6 + P-mab |
| 対象疾患名   | 大腸がん             |
| 1クールの日数 | 14日              |
| 催吐性リスク  | 中等度              |
| その他注意事項 | RAS野生型           |

| No  | 薬剤名                          | 標準投与量                         | 投与方法         | 投与時間          | 投与日     |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 1   | 生食                           | 50mL                          | 点滴静注         | 5分            | day 1   |
| 2   | 生食<br>ベクティビックス<br>(P-mab)注   | 100mL<br>6mg/kg               |              | 1時間           |         |
| 3   | 生食                           | 50mL                          |              | 5分            |         |
| 4   | グラニセトロン注<br>デキサート注           | 1mg 50mL<br>9.9mg             |              | 15分           |         |
| 5-a | ブドウ糖<br>オキサリプラチン<br>(L-OHP)注 | 500mL<br>85mg/m <sup>2</sup>  |              | 2時間<br>(bと同時) |         |
| 5-b | ブドウ糖<br>レボホリナート注             | 250mL<br>200mg/m <sup>2</sup> |              | 2時間<br>(aと同時) |         |
| 6   | ブドウ糖<br>5-FU注                | 50mL<br>400mg/m <sup>2</sup>  | 5分           |               |         |
| 7   | 生食<br>5-FU注                  | 適宜<br>2400mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注<br>(持続) | 46時間          | day 1-3 |

### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

### 【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。
- P-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。