

| | |
|---------|--------------------|
| レジメン名 | weekly PTX + T-mab |
| 対象疾患名 | 乳がん |
| 1クールの日数 | 28日 |
| 催吐性リスク | 軽度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|---------------------------|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| 1 | ジフェンヒドラミン錠 | 50mg | 内服 | 投与前 | day 1, 8, 15 |
| 2 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | day 1, 8, 15, 22 |
| 3 | 生食 トラスツズマブ (T-mab)注 | 250mL 初回4mg/kg 2回目～2mg/kg | | 初回90分 2回目～30分 | |
| 4 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 5 | ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注 | 50mL 6.6mg 20mg | | 15分 | day 1, 8, 15 |
| 6 | ブドウ糖 | 50mL | | 30分 | |
| 7 | ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注 | 250mL 80mg/m ² | | 1時間 | |
| 8 | ブドウ糖 | 50mL | | 5分 | |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。