

レジメン名	DTX + T-mab + PER
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 パージェタ (PER)注	250mL 初回840mg 2回目~420mg		初回60分 2回目~30分	
3	生食	50mL		5分	
4	生食 トラスツズマブ (T-mab)注	250mL 初回8mg/kg 2回目~6mg/kg		初回90分 2回目~30分	
5	生食	50mL		5分	
6	ブドウ糖 デキサート注	50mL 6.6mg		15分	
6	ブドウ糖 ドセタキセル (DTX)注	250mL 75mg/m ²		1時間	
7	ブドウ糖	50mL		5分	
8	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、浮腫、爪障害、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- T-mab、P-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。
- DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。