

レジメン名	DTX + CBDCA + T-mab
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 トラスツズマブ (T-mab)注	250mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg		初回90分 2回目～30分	
3	生食	50mL		5分	
4	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg		30分	
5	ブドウ糖 ドセタキセル(DTX)注	250mL 60mg/m <sup>2</sup>		1時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	ブドウ糖 カルボプラチン(CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	
8	ブドウ糖	50mL		5分	
9	デカドロン錠	4mg 2T/分2	内服	(3日分)	day 2-4

### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、浮腫、爪障害、発熱、発疹、血管痛、心障害、Infusion reaction

### 【その他注意事項】

●DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。

●T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。