

レジメン名	CDDP + CPT-11
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分	
4	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 60mg/m ²		1時間	
5	生食	50mL		5分	
6	グラニセトロン注 デキサート注	50mL 9.9mg		15分	day 8, 15
7	ブドウ糖 イリノテカン(CPT-11)注	500mL 60mg/m ²		90分	day1, 8, 15
8	ブドウ糖	50mL		5分	day 8, 15
9	ソルアセトF	500mL		1時間	day1, (2, 3)
10	アクチット	500mL		1時間	
11	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼		内服	(3日分)

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

【その他注意事項】

●CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)

●CPT-11:コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症のPtには禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St. ジョーンズワートと相互作用あり。