

レジメン名	PEI
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	500mL	点滴静注	1時間	day 1, 8
2	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg		30分	
3	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 25mg/m <sup>2</sup>		1時間	
4	生食	500mL		1時間	
5	生食 デキサート注	50mL 3.3mg		15分	day 2, 3
6	生食 エトポシド(VP-16)注	500mL 60mg/m <sup>2</sup>		1時間	day 1-3
7	生食	50mL		5分	
8	ブドウ糖 イリノテカン(CPT-11)注	500mL 90mg/m <sup>2</sup>		90分	day 8
9	ブドウ糖	50mL		5分	

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、発熱、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

#### 【その他注意事項】

●CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。

●CPT-11:コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。