

| レジメン名 | FOLFIRI + RAM |
|---------|---------------|
| 対象疾患名 | 大腸がん |
| 1クールの日数 | 14日 |
| 催吐性リスク | 中等度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 1 | ジフェンヒドラミン錠 | 50mg | 内服 | 投与前 | day 1 |
| 2 | 生食 デキサート柱 | 50mL 6.6mg | 点滴静注 | 15分 | |
| 3 | 生食 サイラムザ(RAM)注 | 250mL 8mg/kg | | 初回60分 2回目～ 30分 | |
| 4 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 5 | パロノセトロン注 アロカリス注 | 0.75mg 50mL 235mg | | 30分 | |
| 6-a | ブドウ糖 イリノテカン(CPT-11)注 | 500mL 150mg/m ² | | 90分 (bと同時) | |
| 6-b | ブドウ糖 レボホリナート注 | 250mL 200mg/m ² | | 2時間 (aと同時) | |
| 7 | ブドウ糖 5-FU注 | 50mL 400mg/m ² | | 5分 | |
| 8 | 生食 5-FU注 | 適宜 2400mg/m ² | 点滴静注 (持続) | 46時間 | day 1-3 |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、肝障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)発現時は抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。
- RAM: 手術前後は4週間、ポート増設時は2週間休薬する