

レジメン名	CDDP + PEM + BV
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日	
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1	
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間		
3	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 9.9mg		30分		
4	生食 ペメトレキセド(PEM)注	100mL 500mg/m ²		10分		
5	生食	50mL		5分		
6	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 75mg/m ²		1時間		
7	生食	50mL		5分		
8	生食 アバスチン(BV)注	100mL 15mg/kg		初回90分 60分→30分		
9	生食	500mL		5分		
10	ソルアセトF	500mL		1時間		day 1, (2, 3)
11	アクチット	500mL		1時間		
12	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4	

【主な副作用】悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、倦怠感、口内炎、発疹、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。
- PEM: 治療開始7日前より葉酸0.5mgを1日1回連日経口投与、ビタミンB12を1回1mg筋注する(9週間に1回)。NSAIDsや腎毒性を有する薬剤または腎排泄型薬剤(プロベネシド、ペニシリン等)と薬物相互作用あり。
- BV: 手術前後は4週間、ポート増設時は1週間空ける。